



# IMMODIN®

transfer faktor

## PŘI PORUCHÁCH BUNĚČNÉ IMUNITY



e-mail: [obchod@sevapharma.cz](mailto:obchod@sevapharma.cz)  
[www.sevapharma.cz](http://www.sevapharma.cz)



## SLOŽENÍ

**IMMODIN** je dialyzát homogenátu leukocytů periferní krve získané od zdravých dárců, testovaným a nereaktivním na anti-HIV 1+2, anti-HCV, HBsAg a lues. Obsahuje komplex nízkomolekulárních biologicky aktivních látek schopných normalizovat buněčnou imunitu u příjemce.

## TERAPEUTICKÉ INDIKACE

**IMMODIN** se používá především pro normalizaci opakovaně prokázaných poruch buněčné imunity u stavů, kde je tato porucha primární příčinou choroby. Podává se proto zásadně na podkladě předchozího vyšetření imunitního stavu pacienta, a to:

- 1. TERAPEUTICKY:**
  - ◆ u recidivujících chronických infekcí
  - ◆ u těžkých septických stavů
  - ◆ u atopického ekzému, psoriázy
  - ◆ u chronického únavového syndromu na imunodeficitním podkladu
  - ◆ u závažných stavů alergického původu, kde je prokázán defekt buněčné imunity a obvyklá imunoterapie není účinná
- 2. PROFYLAKTICKY:**
  - ◆ u osob, u kterých prováděná léčba vyvolává pokles buněčné imunity
  - ◆ u předoperační přípravy osob s prokázanou buněčnou poruchou imunity
  - ◆ u těžkých úrazů

## KONTRAINDIKACE

Těhotenství a stavy, kde není zásah do buněčné imunity žádoucí (např. po transplantacích).

## NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Subkutánní aplikace preparátu vyvolává lokální bolestivost, která ustává obvykle do 15 minut, netrvá však déle než 24 hodin.

## APLIKACE A DÁVKOVÁNÍ

Dávkování je individuální. Podává se hluboko subkutánně obvykle ve třech dávkách v týdenních intervalech doplněných o čtvrtou dávku, která se podává 1 měsíc po dávce třetí. U těžkých stavů musí být léčba individuální. Jiný způsob aplikace než subkutánní zatím není schválen. Vhodný k použití u dětí od 6 měsíců.

## PODÁVÁNÍ V TĚHOTENSTVÍ A PŘI KOJENÍ

V těhotenství se přípravek nepodává, v období kojení není jeho podání kontraindikováno.

## INTERAKCE

Nejsou známy.

## BALENÍ

1x 1 ampulka lyofilizátu a 1x 4 ml vody na injekci  
5x 1 ampulka lyofilizátu a 5x 4 ml vody na injekci

## DOBA POUŽITELNOSTI

24 měsíců, po rozpuštění ihned použít

Podrobnější informace o přípravcích získáte na níže uvedené adrese nebo prostřednictvím našich farmaceutických reprezentantů.